



# Negretta

Imazio S., Vasile Simone G., Bignami C., 2015. Negretta. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 21/01/2017, ultimo aggiorn. 21/01/2017 url <http://vitisdb.it/accessions/show/15877>

## Informazioni gestite da

Dipartimento di Scienze della Vita - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

## Informazioni generali

**nome** Negretta  
**nazione di selezione** Italia  
**provincia di selezione** Reggio Emilia  
**istituzione custode** Dipartimento di Scienze della Vita - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
**collezione** non disponibile  
**codice** ITA421-RE25  
**regione di selezione** Emilia-Romagna  
**località di selezione** non disponibile

## Varietà & clone

**tipo di origine** spontanea  
**specie** Vitis vinifera  
**varietà** Negretta  
**clone** non disponibile  
**genere** Vitis  
**sub specie** sativa  
**codice della varietà** IVD-var\_148  
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

## Trueness to type

### True-name

confermato **si**

### ►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Aggazzotti F.	1867	Catalogo descrittivo delle principali varietà di uve coltivate presso il csa. Avv. Francesco Aggazzotti del Colombaro.		Tipografia di Carlo Vincenzi, Modena.

### Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

### ►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Aggazzotti F.	1867	Catalogo descrittivo delle principali varietà di uve coltivate presso il csa. Avv. Francesco Aggazzotti del Colombaro.		Tipografia di Carlo Vincenzi, Modena.

### Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

### ►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Meglioraldi S., Ruffa P., Raimondi S., Storchi M., Torello Marinoni D., Vingione M., Boccacci P., Schneider A.,	2013	Conoscere il patrimonio viticolo per tutelarlo		L'Informatore agrario. 23:50-54

loci confrontati n.d.

loci identici n.d.

discrepanze n.d.

loci:	loci predefiniti ( 9 )																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	143	231	239	239	253	185	185	192	194	245	251	242	256	231	263	253	270

### Immagini



germoglio



foglia



grappolo



acino



vinacciolo

### Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	5	media	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	2	verde e rosso	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	3	bronzato	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	7	elevata	
065	Foglia adulta: dimensione del lembo	3	piccolo	
067	Foglia adulta: forma del lembo	2 / 3	cuneiforme / pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	3	cinque	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	2	solo al punto peziolare	
072	Foglia adulta: depressioni del lembo	3	deboli	
074	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale	5	contorto	
075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
076	Foglia adulta: forma dei denti	3	entrambi i lati convessi	
078	Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza	5	medi	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	1	a U	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	

081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
082	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori	2	chiusi	
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	3	bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	5	media	
094	Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori	5	medio	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
155	Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3)	5	media (1,1-1,3)	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	7	lungo	
204	Grappolo: compattezza	7	compatto	
208	Grappolo: forma	1 / 2	cilindrico / conico	
220	Acino: lunghezza	5	medio	
221	Acino: larghezza	5	medio	
223	Acino: forma	2 / 3	sferoidale / ellissoidale largo	
225	Acino: colore della buccia	6	blu nero	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

### Ampelometria

#### OIV

OIV	PDF	descrizione	valore	
601	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1	( Ø 106.40 )	
602	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2	( Ø 85.80 )	
603	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3	( Ø 62.00 )	
604	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4	( Ø 44.30 )	
605	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore	( Ø 40.30 )	
606	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore	( Ø 41.90 )	
607	PDF	Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	( Ø 57.90 )	
608	PDF	Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	( Ø 53.90 )	
609	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione	( Ø 59.40 )	
610	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5	( Ø 67.40 )	
611	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5	( Ø 19.30 )	
612	PDF	Foglia adulta: lunghezza del dente di N2	( Ø 10.00 )	
613	PDF	Foglia adulta: larghezza del dente di N2	( Ø 11.40 )	
614	PDF	Foglia adulta: lunghezza del dente di N4	( Ø 6.70 )	
615	PDF	Foglia adulta: larghezza del dente di N4	( Ø 9.40 )	
617	PDF	Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2	( Ø 39.10 )	
618	PDF	Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare	( Ø -12.00 )	

## Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Negretta

## Fenologia &amp; produzione

nessun descrittore presente per Negretta

## Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Negretta

## Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Negretta

## Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Negretta

## Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Negretta

## Bibliografia correlata (5)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Regione Emilia Romagna	2011	Scheda tecnica per l'iscrizione al repertorio Negretto RER V040		Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna. Parte seconda. N.4
Re F.	1800	Viaggio agronomico per la montagna reggiana e Dei mezzi di migliorare l'agricoltura delle montagne reggiane		Manoscritto, edito a cura di Carlo Casali. - Reggio Emilia : Officine grafiche reggiane, 1927. - 92 pp
Aggazzotti F.	1867	Catalogo descrittivo delle principali varietà di uve coltivate presso il csa. Avv. Francesco Aggazzotti del Colombaro.		Tipografia di Carlo Vincenzi, Modena.
Casali C.	1915	I nomi delle piante nel dialetto reggiano.		Atti del Consorzio di Reggio Emilia n.1. Tipografia Bondavalli. Reggio nell'Emilia. 126 pp.
Maini L.	1851	Catalogo alfabetico di quasi tutte le uve o viti conosciute e coltivate nelle provincie di Modena e Reggio secondo i loro nomi volgari.		Tipografia Moneti e Pelloni, Modena

## Accessioni della medesima varietà (1)

- Negretta - Dipartimento di Scienze della Vita - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

## Note

<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:UseFELayout /> <w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif--><!--[if gte mso 10]> <style> /\* Style Definitions \*/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif--></p> <p class="MsoNormal"><strong>Notizie storiche</strong></p> <p class="MsoNormal">Non &egrave; facile ricostruire la storia della Negretta, in quanto con questo nome o nomi simili (Negretto) sono stati indicati vitigni diversi, accomunati dal colore scuro della buccia. La Negretta non corrisponde al Negretto, o Negrettino, un tempo diffusamente coltivato nel Bolognese e oggi molto raro, di recente iscritto al Repertorio regionale volontario delle variet&agrave; della Regione Emilia Romagna (2011). Per l&rsquo;area di coltivazione e le caratteristiche, &egrave; invece molto probabile che l&rsquo;attuale Negretta corrisponda alla variet&agrave; Negretta descritta a met&agrave; del Settecento dal Caula e dall&rsquo;Aggazzotti un secolo dopo. Caula, nelle annotazioni al ditirambo &ldquo;I vini modenesi&rdquo; di GB. Vicini (1751), <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>fedelmente trascritte da Maini nel suo Catalogo (1851), non esprime nel complesso un giudizio positivo sulla qualit&agrave; dell&rsquo;uva della Negretta, ma ne rileva forti differenze nelle tipologie a picciolo <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>non rosso e a picciolo rosso, quest&rsquo;ultima molto migliore della prima, <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>e la variabilit&agrave; in funzione della fertilit&agrave; del terreno. Descrive inoltre la somiglianza con la Berzemina, da cui si differenzia per il &ldquo;guscio non cos&igrave; sodo&rdquo; e per i raspi pi&ugrave; sottili. Filippo Re (1800) cita tra le uve nere coltivate nelle montagne reggiane alla fine del Settecento <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>la Nigrella, che&nbsp;&nbsp;&nbsp; dovrebbe essere&nbsp;&nbsp;&nbsp; sinonimo di Negretta, stando all&rsquo;elenco dei nomi dialettali reggiani di piante del Casali (1915), che&nbsp;&nbsp;&nbsp; riporta i nomi &Oacute;va nigr&egrave;tta e &Oacute;va nigr&egrave;lla, come sinonimi dialettali. Anche Aggazzotti (1867) riporta la descrizione della Negretta, del suo &ldquo;grappolo piramidale, a grani piuttosto serrati&rdquo; e dell&rsquo;&ldquo;acino alquanto ovale, di giusta grossezza (15 millim) non affatto opaco&rdquo; e parla dei difetti di qualit&agrave; dell&rsquo;uva rispetto alla &lsquo;lambrusca&rsquo;, della scarsa conservabilit&agrave; del vino e della alta produttivit&agrave; e vigoria della pianta.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Diffusione e variabilit&agrave;</p> <p class="MsoNormal">&Egrave; molto rara nel territorio reggiano e modenese</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></p>