



Pampanone RO VT5

Muganu M., Paolucci M., 2013. Bellone. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-006X

release 17/07/2015, ultimo aggiorn. 17/07/2015 url <http://vitisdb.it/accessions/show/15919>

Informazioni gestite da

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università della Tuscia, Viterbo

Informazioni generali

nome Pampanone RO VT5
nazione di selezione Italia
provincia di selezione Viterbo
istituzione custode Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università della Tuscia, Viterbo
collezione Azienda Agraria Didattico-Sperimentale Università della Tuscia

codice ITA062-RO VT5
regione di selezione Lazio
località di selezione Bolsena

Varietà & clone

tipo di origine spontanea
specie Vitis vinifera
varietà Bellone b.
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

genere Vitis
sub specie sativa
codice della varietà IVD-var_356

Trueness to type

True-name

confermato **si**

►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Prosperi V., Pirovano A., Bruni B.	1962	Bellone		Principali vitigni da vino coltivati in Italia, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Prosperi V., Pirovano A., Bruni B.	1962	Bellone		Principali vitigni da vino coltivati in Italia, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Muganu M., Dangi G., Aradhya M., Frediani M., Scossa A., Stover E.	2009	Ampelographic and DNA Characterization of Local Grapevine Accessions of the Tuscia Area (Latium, Italy)	American Journal of Enology and Viticulture	(60,1): 110-115

loci confrontati **n.d.**

loci identici **n.d.**

discrepanze **n.d.**


Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	135	145	227	231	239	247	179	179	188	204	251	259	240	242	239	265	253	259


Immagini



germoglio



germoglio pagina superiore



germoglio pagina inferiore



foglia



foglia pagina superiore



foglia pagina inferiore



grappolo



acino




vinacciolo

Ampelografia


OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
002	Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice	1	assente	
003	Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice	1	nulla o molto bassa	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	7 / 9	elevata / molto elevata	
006	Germoglio: portamento (prima della legatura)	7	semi-ricadente	

007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	3	rosso
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	2	verde e rosso
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	1 / 2	verde / giallo
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	7 / 9	elevata / molto elevata
065	Foglia adulta: dimensione del lembo	7	grande
067	Foglia adulta: forma del lembo	2 / 3	cuneiforme / pentagonale
068	Foglia adulta: numero dei lobi	3	cinque
069	Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo	7	verde scuro
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	2	solo al punto peziolare
071	Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo	2 / 3	solo al punto peziolare / fino alla 1a biforcazione
072	Foglia adulta: depressioni del lembo	3	deboli
074	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale	4 / 2	revoluto / a V
075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	7	elevata
076	Foglia adulta: forma dei denti	5	misto tra entrambi i lati rettilinei (livello 2) e entrambi i lati convessi (livello 3)
078	Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza	5 / 7	medi / lunghi
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	3	a V
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	3 / 2	su entrambi i lati / su di un lato
082	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori	2 / 3	chiusi / leggermente sovrapposti
083-1	Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori	1	a U
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	7 / 9	elevata / molto elevata
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	7	elevata
093	Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana	1	più corto
094	Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori	5	medio
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato
153	Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio	2	da 1,1 a 2 infiorescenze
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	5	medio
203	Grappolo: larghezza	5 / 7	medio / largo
204	Grappolo: compattezza	5 / 7	medio / compatto
206	Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale	3	corto
207	Grappolo: lignificazione del peduncolo	5	fino a circa la metà
208	Grappolo: forma	2	conico
209	Grappolo: numero di ali del grappolo principale	2	1 - 2 ali
220	Acino: lunghezza	5 (Ø 4)	medio
221	Acino: larghezza	5 (Ø 4)	medio
223	Acino: forma	2	sferoidale
225	Acino: colore della buccia	1	verde giallo



226	Acino: uniformità del colore della buccia	1	non uniforme	
227	Acino: pruina	5	media	
228	Acino: spessore della buccia	3	sottile	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
232	Acino: succulenza della polpa	2	mediamente succosa	
235	Acino: consistenza della polpa	2	leggermente soda	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
238	Acino: lunghezza del pedicello	3	corto	
240	Acino: facilità di separazione dal pedicello	2	facile	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	
243	Acino: peso dei vinaccioli	5	medio	
244	Acino: scanalature trasversali sulla faccia dorsale dei vinaccioli	1	assenti	

Ampelometria



foglia ampelometrica

OIV

OIV	PDF	descrizione	valore
601	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1	(Ø 174.50)
602	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2	(Ø 154.50)
603	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3	(Ø 110.50)
604	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4	(Ø 82.60)
605	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore	(Ø 80.80)
606	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore	(Ø 74.70)
607	PDF	Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	(Ø 53.90)
608	PDF	Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	(Ø 53.50)
609	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione	(Ø 59.10)
610	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5	(Ø 70.40)
611	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5	(Ø 40.60)
612	PDF	Foglia adulta: lunghezza del dente di N2	(Ø 14.70)
613	PDF	Foglia adulta: larghezza del dente di N2	(Ø 15.60)
614	PDF	Foglia adulta: lunghezza del dente di N4	(Ø 10.00)
615	PDF	Foglia adulta: larghezza del dente di N4	(Ø 15.50)
617	PDF	Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2	(Ø 61.20)
618	PDF	Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare	(Ø -23.30)

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Pampanone RO VT5

Fenologia & produzione

OIV	descrizione	valore	
301	Epoca di germogliamento	3 / 5	precoce / media
351	Vigoria del germoglio	7 / 9	elevata (90-100 g) / molto elevata (>110 g)
502	Grappolo: peso di un grappolo	5	medio (450-550 g)
503	Acino: peso di un acino	3	basso (2,5-3,5 g)
505	Tenore in zucchero del mosto	7	elevato (20,2-21,8)
506	Acidità totale del mosto	3	bassa (5,2-6,8)

Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Pampanone RO VT5

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Pampanone RO VT5

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Pampanone RO VT5

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Pampanone RO VT5

Bibliografia correlata (2)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Marzotto N.	1925	Uve da vino		voll. I-II, Tipografia Commerciale, Vicenza.
Prosperi V.	1939	I vitigni pregiati dei Castelli Romani.		REDA (Roma)

Accessioni della medesima varietà (1)

- Pampanone RO VT5 - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università della Tuscia, Viterbo

Note

Francesco De Bosis (1875): scheda ampelografica completa del vitigno Empibotte, nel complesso dei sinonimi del quale, si ritrova anche Bellone, Cacchione e Zinna di vacca nella provincia di Roma. Bullettino ampelografico (1881): descrizione completa della vegetazione e del frutto del “Bellone”: …Eso è di vegetazione rigogliosissima, può dirsi di produzione certa, ma in alcuni anni è abbondantissima, in altri scarsa. …grappolo grande ed in terre leggere grandissimo, di forma piramidale, colle due ali superiori sporgenti. Il peduncolo grosso, duro, legnoso, corto in proporzione del grappolo, acini grossi, rotondi, color verde chiaro, che alla maturazione si tinge un poco in giallo, buccia molto sottile, soggetta ad infracidare, succo molto acquoso, generalmente due vinaccioli. Mengarini F.(1888), relativamente al circondario di Velletri, per i vini bianchi, menziona oltre ai più diffusi, il Bellone. Mancini C.(1893): “…Il Cacchione è presente tra i vitigni del Frosinonese e dei Castelli”. Norberto Marzotto(1925), “Uve da vino”, Volume II, Vicenza. </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Scheda ampelografica completa del Bellone. Si coltiva nelle colline Romane, produzione certa, ma alternante scarsa-abbondantissima.Prosperi V. “I vini pregiati dei Castelli Romani (1939): Bellone. E’ tra i vitigni minori dei Castelli ammessi fino al 10% dalla Corporazione Vitivinicola per la zona.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Zucchini M.(1961) “La viticoltura nel Lazio”, relazione tratta dagli Atti dell’Accademia della Vite e del Vino, vol. XIII, Siena. Il Cacchione è tra i vitigni coltivati in provincia di Frosinone con il 10% di produzione sul totale delle uve bianche, in quella di Latina con il 16%, in quella di Roma con il 14%. Nei vini di Latina e Roma, è una varietà molto presente. </p>