

Carattere:	Germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle perule delle gemme	Code N°
Caractère:	Rameau: distribution de la pigmentation anthocyane sur les écailles des bourgeons	OIV 015-1
Merkmal:	Trieb: Verteilung der Anthocyanfärbung auf den Knospenschuppen	
Characteristic:	Shoot: distribution of anthocyanin coloration on the bud scales	
Carácter:	Pámpano: distribución de la pigmentación antociánica sobre las brácteas de las yemas	

Livelli di espressione / Notation / Bonitierung / Notes / Notación:

1	2	3	4
assente	basale	fino a 3/4 della perula	quasi sull' intera perula
absente	basale	jusqu' à 3/4 des écailles	sur la totalité des écailles
fehlend	basal	bis zu 3/4 der Knospenschuppe	nahezu auf der ganzen Knospenschuppe
absent	basal	up to 3/4 of bud scale	almost on the whole bud scale
ausente	en la base	hasta 3/4 de la bráctea	casi en toda la bráctea


Varietà di riferimento / Exemples de variétés / Beispieldsorten / Example varieties / Ejemplos de variedades:

1	2	3	4
Müller-Thurgau B	Cabernet Sauvignon N	Gewürztraminer Rg	Chardonnay B
Merlot N			
Garnacha tinta N			

Indicazioni / Définitions / Definitionen / Definitions / Indicaciones:

- I: Osservazione da effettuare alla fioritura sul terzo mediano del germoglio. Rilievo su 10 gemme iibernanti di parecchi germogli esposte alla luce. Basale: il terzo inferiore della perula. Nota: la distribuzione della pigmentazione antocianica dipende dalla luce.
- F: Observation à faire à la floraison sur le tiers médian du rameau. Notation sur 10 bourgeons latents de plusieurs rameaux exposés à la lumière. Basale: le tiers inférieur des écailles. Remarque: la distribution de la pigmentation anthocyane dépend de la lumière.
- D: Feststellung während der Blüte am mittleren Drittel des Triebes. Beurteilung von 10 lichtexponierten Winterknospen mehrerer Triebe. Basal: unteres Drittel der Knospenschuppe. Bemerkung: Verteilung der Anthocyanfärbung ist lichtabhängig.
- E: Observation during flowering at the middle third of a shoot. Examination of 10 light exposed winter buds of several shoots. Basal: lower third of bud scale. Remark: distribution of anthocyanin coloration is light dependent.
- S: Observación a realizar en la floración sobre el tercio medio del pámpano. Media de 10 yemas latentes de varios pámpanos (cara soleada). Basal: el tercio inferior de la bráctea. Nota: la distribución del color depende de la luz.

Gemma ibernante
Bourgeon latent
Winterknospe
Winter bud
Yema latente



Zona da osservare
Zone à observer
Beurteilungsbereich
Observation area
Zona a describir