

Carattere:	Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi	Codes N°s
Caractère:	Rameau: densité des poils dressés sur les entrenœuds	OIV 012
Merkmal:	Trieb: Dichte der Borstenbehaarung auf den Internodien	UPOV 15
Characteristic:	Shoot: density of erect hairs on internodes	Bioversity 6.1.11
Carácter:	Pámpano: densidad de los pelos erguidos sobre los entrenudos	

Livelli di espressione / Notation / Bonitierung / Notes / Notación:

1	3	5	7	9
nulla o molto bassa	bassa	media	elevata	molto elevata
nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
fehlend oder sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
none or very low	low	medium	high	very high
nula o muy baja	baja	media	alta	muy alta

Varietà di riferimento / Exemples de variétés / Beispieldsorten / Example varieties / Ejemplos de variedades:

1	3	5	7	9
<i>V. vinifera</i>	161-49 Couderc	Teleki 8 B	Kober 125 AA	<i>V. cinerea</i>
			Fercal	Ecole Montpellier 34
			775 Paulsen	Boerner

Indicazioni / Définitions / Definitionen / Definitions / Indicaciones:

- I: Osservazione da effettuare alla fioritura sul terzo mediano del germoglio. Rilievo su 10 internodi. Osservazione dei peli eretti nella parte centrale degli internodi.
- F: Observation à faire à la floraison sur le tiers médian du rameau. Notation sur 10 entrenœuds. Observation des poils dressés dans la partie centrale des entrenœuds.
- D: Feststellung während der Blüte am mittleren Drittel des Triebes. Beurteilung von 10 Internodien. Festgestellt wird die Borstenbehaarung im mittleren Bereich des Internodiums.
- E: Observation during flowering at the middle third of a shoot. Examination of 10 internodes. The erect hairs within the middle part of the internodes have to be observed.
- S: Observación a realizar en la floración sobre el tercio medio del pámpano. Notación de 10 entrenudos. Deben observarse los pelos erguidos en la parte central de los entrenudos.

