

Carattere:	Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo	Code N° OIV 071
Caractère:	Feuille adulte: distribution de la pigmentation anthocyane des nervures principales de la face inférieure du limbe	
Merkmal:	Ausgewachsenes Blatt: Bereich der Anthocyanfärbung der Hauptadern auf der Unterseite der Spreite	
Characteristic:	Mature leaf: area of anthocyanin coloration of main veins on lower side of blade	
Carácter:	Hoja adulta: distribución de la pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo	

Livelli di espressione / Notation / Bonitierung / Notes / Notación:				
1 assente	2 solo al punto peziolare	3 fino alla 1 <sup>a</sup> biforcazione	4 fino alla 2 <sup>a</sup> biforcazione	5 oltre la 2 <sup>a</sup> biforcazione
nulle	seulement au point pétioinaire	jusqu'à la 1 <sup>ère</sup> bifurcation	jusqu'à la 2 <sup>ème</sup> bifurcation	au-delà de la 2 <sup>ème</sup> bifurcation
fehlend	nur Stielansatz	bis zur 1. Adernverzweigung	bis zur 2. Adernverzweigung	über 2. Adernverzweigung hinaus
absent nula	only at the petiolar point sólo n el punto peciolar	up to the 1 <sup>st</sup> bifurcation hasta la primera bifurcación	up to the 2 <sup>nd</sup> bifurcation hasta la segunda bifurcación	beyond the 2 <sup>nd</sup> bifurcation por encima de la segunda bifurcación

Varietà di riferimento / Exemples de variétés / Beispieldsorten / Example varieties / Ejemplos de variedades:				
1 Garnacha tinta N	2 Perle von Csaba B	3 Gamay noir N Chasselas blanc B	4 Palomino Fino B Chenin blanc B	5

Indicazioni / Définitions / Definitionen / Definitions / Indicaciones:				
I:	Osservazione da effettuare tra l'allegagione e l'invaiatura su almeno 10 foglie adulte del terzo mediano di parecchi germogli. Rilevare la distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali N <sub>1</sub> - N <sub>3</sub> .			
F:	Observation à faire entre la nouaison et la véraison sur au moins 10 feuilles adultes du tiers médian de plusieurs rameaux. Notation de la distribution de la pigmentation anthocyane sur les nervures principales N <sub>1</sub> - N <sub>3</sub> .			
D:	Feststellung zwischen Beerenansatz und Weichwerden der Beeren. Beurteilung von mindestens 10 ausgewachsenen Blättern am mittleren Drittel mehrerer Triebe. Beurteilt wird die Verteilung der Anthocyanfärbung auf den Hauptadern N <sub>1</sub> - N <sub>3</sub> .			
E:	Observation between berry set and veraison. Examination of at least 10 mature leaves from the middle third of several shoots. The distribution of anthocyanin coloration on the main veins N <sub>1</sub> - N <sub>3</sub> has to be assessed.			
S:	Observación a realizar entre el cuajado y el envero sobre al menos 10 hojas adultas en el tercio medio de varios pámpanos. Notación de la distribución de la pigmentación antociánica sobre los nervios principales N <sub>1</sub> - N <sub>3</sub> .			

