



Vien de Nus

Schneider A., Ruffa P., Raimondi S., 2014. Vien de Nus. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 14/06/2015, ultimo aggiorn. 14/06/2015 url <http://vitisdb.it/varieties/show/1019>

Informazioni generali gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Ringraziamenti

Ager Foundation

Informazioni botaniche

nome Vien de Nus
tipo di origine spontanea
specie Vitis vinifera
gruppo di varietà non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti
codice IVD-var_227

genere Vitis
sottospecie sativa
vitigno da vino

True-name

confermato **si**

Bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Dalmasso G., Reggio L.	1964	Vien de Nus		In: Principali vitigni da vino coltivati in Italia. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (Roma), III.

Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti **si**

codice 265

nome ufficiale Vien de Nus N.

Sinonimi

sinonimi accertati (1)

sinonimi accertati dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
 Gros Oriou(Valle d'Aosta)

Accessione principale

accessione principale Vien de Nus 30

componente che l'ha inserita Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Accessioni standardizzate (1)

- Vien de Nus 30 - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Tutte le accessioni (1)

- Vien de Nus 30 - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	155	225	235	239	247	189	189	194	194	247	251	242	242	261	261	241	253

Immagini



germoglio



foglia



grappolo



acino

Riferimenti storici

Il primo riferimento al nome Vien de Nus è del Gatta (1838) che gli attribuisce il sinonimo di Gros vien (ripreso da di Rovasenda, 1877), dove “vien” indica in vernacolo aostano “pianta”, ovvero vitigno. “Gros” si riferisce invece alla dimensione delle bacche, ben più grandi di quelle dell’altro vitigno ad uva nera tipico della Valle d’Aosta, il Petit rouge. Berget (1904) ritiene che il Vien de Nus o Plant de Nus (o Gros Oriou de Nus) sia una selezione degli Orioux, un gruppo di vecchi vitigni valdostani a cui apparterebbe anche il Petit rouge. Secondo Berget il Vien de Nus sarebbe stato selezionato non prima del XVIII secolo nei pressi di Nus, tra Aosta e Saint Vincent e da qui avrebbe guadagnato varie zone della valle centrale, sia sulla destra che sulla sinistra orografica della Dora, per via della sua rusticità ed elevata produttività, fino a raggiungere anche un quarto della superficie vitata di quelle zone.

Le analisi genetiche sembrano dare ragione a Berget perché parrebbe proprio che il Vien de Nus altro non sia che un semenzale di Petit rouge, ottenuto da un altro genitore sconosciuto o forse scomparso (Vouillamoz e Moriondo, 2011).

Una descrizione moderna del Vien de Nus è quella redatta da Dalmasso e Reggio (1964).

Diffusione & variabilità



La superficie interessata oggi dalla coltura del Vien de Nus è in regressione e assai modesta: negli ultimi dieci anni è passata dai 25 ai 13 ha attuali (Anderson e Aryal, 2013), localizzati in un’area compresa tra Donnas e Aosta. Da un punto di vista morfologico il Vien de Nus ricorda il Petit rouge, ma con una foglia più piccola e più incisa e acini decisamente più grandi e arrotondati.

Utilizzazione tecnologica


Le uve di Vien de Nus si utilizzano solo per la vinificazione e raramente in purezza, poiché danno un vino di pronta beva ma di alcolicità e struttura scarsa, anche per via dell’elevata produttività del vitigno, allevato generalmente nei suoli freschi e profondi.

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell’apice	5	completamente aperto	
003	Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell’apice	1	nulla o molto bassa	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell’apice	5	media	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	1	verde	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	1 / 2	verde / giallo	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	3	bassa	
067	Foglia adulta: forma del lembo	3	pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	3 / 4 (Ø 5)	cinque / sette	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
072	Foglia adulta: depressioni del lembo	3	deboli	
074	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale	1 / 3	piano / involuto	
075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	5	media	
076	Foglia adulta: forma dei denti	5	misto tra entrambi i lati rettilinei (livello 2) e entrambi i lati convessi (livello 3)	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	5	chiuso	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	2	a parentesi graffa (I)	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature	1	nulla o molto bassa	

	principali sulla pagina inferiore del lembo			
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	5	media	
094	Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori	5 / 7	medio / profondo	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	5 / 7	medio / lungo	
204	Grappolo: compattezza	5	medio	
206	Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale	5	medio	
208	Grappolo: forma	2	conico	
209	Grappolo: numero di ali del grappolo principale	2	1 - 2 ali	
220	Acino: lunghezza	5	medio	
221	Acino: larghezza	5	medio	
223	Acino: forma	2	sferoidale	
225	Acino: colore della buccia	6	blu nero	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria



foglia ampelometrica

OIV

OIV	PDF	descrizione	valore	
601	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1	(Ø 137.00)	
602	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2	(Ø 118.40)	
603	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3	(Ø 87.45)	
604	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4	(Ø 63.55)	
605	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore	(Ø 46.25)	
606	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore	(Ø 45.35)	
607	PDF	Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	(Ø 54.10)	
608	PDF	Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	(Ø 55.25)	
609	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione	(Ø 59.50)	
610	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5	(Ø 49.90)	
611	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5	(Ø 27.15)	
617	PDF	Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2	(Ø 57.90)	
618	PDF	Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare	(Ø -10.90)	

Superampelo

distanze		
descrittore	valore	deviazione standard
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro	46.000	7.600
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro	44.700	7.700
Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro	45.900	10.500
Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro	46.600	8.600
Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4'	11.300	1.800
Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4	10.600	2.700
Lunghezza della nervatura N5'	26.300	3.700
Lunghezza della nervatura N5	28.000	5.500
Lunghezza della nervatura N4'	54.700	5.000
Lunghezza della nervatura N4	55.300	7.400
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4'	63.700	5.900
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4	63.400	7.800
Lunghezza della foglia	192.700	15.900
Larghezza della foglia	179.200	14.300
Lunghezza della foglia compreso il picciolo	225.000	16.400
Lunghezza del picciolo	88.000	9.500
Lunghezza della nervatura N1	137.000	10.700
Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2'	163.500	18.900
Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3'	173.800	15.400
Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4'	73.100	11.900
Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP'	-10.900	4.900
Lunghezza della nervatura N2	117.600	9.800
Lunghezza della nervatura N2'	119.200	8.300
Lunghezza della nervatura N3	87.100	8.800
Lunghezza della nervatura N3'	87.800	8.800
Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2	50.300	11.700
Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2'	65.500	12.200

angoli		
descrittore	valore	deviazione standard
Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	52.800	4.700
Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione	55.400	6.400
Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	55.900	6.700
Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione	54.600	6.100
Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3	60.400	6.100
Angolo tra N3' e N4'	58.600	4.900
Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature	39.300	8.000
Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature	48.800	7.600
Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature	50.500	6.200
Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature	49.300	7.600
Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature	52.800	3.800
Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature	48.900	4.500
Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP'	18.900	10.000
Angolo tra D e D' con centro in N1	90.900	7.800
Angolo tra S e S' con centro in N1	25.300	5.000
Angolo tra I e I' con centro in N1	37.400	5.400

rapporti		
descrittore	valore	deviazione standard
Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato destro	1.020	0.150
Rapporto tra la somma degli angoli a' + b' e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS' e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI'	0.020	0.000
Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI	0.020	0.000
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5' e la lunghezza della nervatura N1	0.190	0.020
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1	0.200	0.030
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4' e la lunghezza della nervatura N1	0.400	0.030
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1	0.400	0.040
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1	0.640	0.040
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1	0.640	0.040
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2' e la lunghezza della nervatura N1	0.870	0.040
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1	0.860	0.050
Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia	1.080	0.040
Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1	0.640	0.070
Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2	0.400	0.060
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2'	0.380	0.080
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3	0.520	0.090
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI' e la lunghezza della nervatura N3'	0.530	0.110
Media della base dei denti del lato sinistro	11.130	1.750
Media dell'altezza dei denti del lato sinistro	10.700	1.140
Media della base dei denti del lato destro	10.880	1.810
Media dell'altezza dei denti del lato destro	10.980	1.810
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4'	0.790	0.130
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4	0.820	0.130
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2'	1.120	0.140
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2	1.180	0.180
Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato sinistro	0.980	0.160

Bibliografia (6)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Anderson K., Aryal N.	2013	Database of Regional, National and Global Winegrape Bearing Areas by Variety, 2000 and 2010.		Wine Economics Research Centre, University of Adelaide.
Berget A.	1904	Orious		In: Ampélographie, par Viala P. et Vermorel V., Tome V.
Dalmasso G., Reggio L.	1964	Vien de Nus		In: Principali vitigni da vino coltivati in Italia. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (Roma), III.
Di Rovasenda G.	1877	Saggio di una ampelografia universale.		Tipografia Subalpina, Torino.
Gatta L. F.	1838	Saggio intorno alle viti ed ai vini della Valle d'Aosta		Ristampa 1971. F.lli Enrico editori. Aosta.
Vouillamoz J.F., Moriondo G.	2011	Origine des cépages valaisans et valdôtains.		Ed. du Belvédère, Fleurier, CH