© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Albanello B.

Ansaldi G., Barbagallo M. G., Brancadoro L., De Lorenzis G., Di Lorenzo R., Falco V., Fici G., Gagliano F., Marino G., Monteleone G., Pisciotta A., Scienza A., 2015. Albanello. in: Italian Vitis Datababase, www.vitisdb.it. ISSN 2282-006X

**release** 24/11/2014, **ultimo aggiorn.** 15/11/2018 **url** http://vitisdb.it/varieties/show/1282

## Informazioni generali gestite da

Regione Siciliana **-** Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala

Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali - Università degli Studi di Milano  Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - Università degli Studi di Palermo
Ansaldi Giacomo  Barbagallo Maria Gabriella  Brancadoro Lucio  De Lorenzis Gabriella  Di Lorenzo Rosario  Falco Vito  Fici Giuseppe
Gagliano Franco  Marino Gregorio  Monteleone Giuseppe  Pisciotta Antonino  Scienza Attilio

## Ringraziamenti

Regione Sicilia, Ager Foundation

## Informazioni botaniche

**nome** Albanello B.
**tipo di origine** spontanea
**specie** Vitis vinifera
**gruppo di varietà** Neutre
**trueness to type** no
**codice** IVD-var_366

**genere** Vitis
**sottospecie** sativa
**vitigno da** vino

## True-name

confermato  **incerto**

## Registrazione

**iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti** si
**codice** 005
**nome ufficiale** Albanello B.

## Sinonimi

**sinonimi ufficiali (4)**
sinonimi riportati nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite
Arvanella  Claretta  Arnina bianca  Avvina
**denominazioni errate (1)**
denominazioni errate indicate dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
Montonico bianco

## Accessione principale

**accessione principale** Albanello
**componente che l'ha inserita** Regione Siciliana **-** Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala

## Accessioni standardizzate (1)

- Albanello - Regione Siciliana **-** Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala

## Tutte le accessioni (1)

- Albanello - Regione Siciliana **-** Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala

## Cloni omologati (1)

I - Albanello Regione Sicilia 31

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 145 | 231 | 239 | 239 | 239 | 179 | 191 | 188 | 196 | 243 | 251 | 240 | 240 | 231 | 261 | 253 | 253 |

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

## Immagini




**germoglio**




**foglia**




**grappolo**




**acino**




**vinacciolo**

## Riferimenti storici

Di origine sconosciuta è una delle varietà più antiche della Sicilia costituendo uno dei vitigni storici coltivati delle provincie di Siracusa, Ragusa e Catania. Il vitigno è sempre associato al vino Albanello tipico per la provincia di Siracusa, nelle tipologie secco, asciutto, dolce e liquoroso. Epicarmo poeta siciliano vissuto intorno al 500 a.c. parla di un vino Albanello. E' descritto dal Nicosia (1735). Diversi Autori, Notari (1892), Giulietti (1879), Puillat (1888), Trentin (1895) Viala e Vermonel (1901), Marescalchi (1928) parlano del vino e quindi del vitigno Albanello. Il Mendola (1868) nel suo Catalogo riporta l'*Albanello* proveniente da Siracusa e dice: "quest'uva produce il liquore prelibato che porta il nome stesso". Saverino Landolina Nava (1802) nella lettera "Dell'antico vino Pollio Siracusano" scrive " l'Albanello è un liquore che si fa dall'uva così chiamata. E' preferito al moscato, è più soave perché non ha quella grassa dolcezza che nausea, ma è più fluido, brillante e delicato. Pur non di meno è molto raro e forse non è conosciuto fuori dalla Sicilia". Presenta alcune analogie morfologiche con *l'Albaranzeuli bianco* della Sardegna (Robinson et al. 2012).

## Diffusione & variabilità

La coltivazione è limitata alla provincia di Siracusa, dove si è andata notevolmente riducendo a pochissimi esemplari, ceppi sparsi sono presenti anche nei vigneti ragusani.

## Utilizzazione tecnologica

I vini presentano una gradazione alcolica sufficiente, accompagnata da una discreta acidità totale e pH nella norma. I vini presentano una gradazione alcolica più che sufficiente così come i valori di acidità fissa e il pH. Il vino ha una intensità colorante medio alta. Presenta una buona intensità e complessità olfattiva dei vari descrittori espressi più o meno alla stessa intensità con lieve prevalenza del solo floreale agrumi. Al gusto ha una struttura e una acidità bassa, la sensazione alcolica come la persistenza aromatica è nella media, lieve prevalenza della percezione di amaro.

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto |  |
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 7 | elevata | |
| 006 | Germoglio: portamento (prima della legatura) | 3 / 5 | semi-eretto / orizzontale | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 2 | verde e rosso | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 013 | Germoglio: densità dei peli striscianti sui nodi | 7 | elevata | |
| 014 | Germoglio: densità dei peli striscianti sugli internodi | 7 | elevata | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 3 / 4 | bronzato / ramato - rosso | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 7 | elevata | |
| 065 | Foglia adulta: dimensione del lembo | 5 / 7 | medio / grande | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 3 / 4 (⊘ 2) | pentagonale / orbicolare | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 | cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 3 | fino alla 1a biforcazione | |
| 072 | Foglia adulta: depressioni del lembo | 3 / 5 | deboli / medie | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 074 | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale | 2 / 3 | a V / involuto |
| 075 | Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo | 3 | bassa |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 3 / 2 | entrambi i lati convessi / entrambi i lati rettilinei |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 7 | sovrapposto |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 3 / 1 | a V / a U |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata |
| 082 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori | 1 | aperti |
| 083-1 | Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori | 3 / 1 | a V / a U |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superori | 1 | assenti |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 7 | elevata |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa |
| 093 | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana | 3 | leggermente più corto |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 5 / 7 | medio / lungo |
| 204 | Grappolo: compattezza | 5 / 7 | medio / compatto |
| 208 | Grappolo: forma | 1 / 2 | cilindrico / conico |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 2 | 1 - 2 ali |
| 220 | Acino: lunghezza | 3 | corto |
| 221 | Acino: larghezza | 3 | stretto |
| 223 | Acino: forma | 2 | sferoidale |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo |










## Ampelometria

*OIV*

| OIV | PDF | descrizione | valore | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | ( ⊘ 109.96 ) | |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | ( ⊘ 95.69 ) | |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | ( ⊘ 71.56 ) | |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | ( ⊘ 47.86 ) | |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | ( ⊘ 62.83 ) | |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | ( ⊘ 58.18 ) | |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | ( ⊘ 65.34 ) | |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | ( ⊘ 53.58 ) | |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | ( ⊘ 67.45 ) | |
| 611 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5 | ( ⊘ 26.58 ) | |
| 617 | PDF | Foglia adulta: distanza tra l'estremitá di N2 e l'estremitá della prima nervatura secondaria di N2 | ( ⊘ 55.24 ) | |
| 618 | PDF | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare | ( ⊘ -6.31 ) | |

*Superampelo*

| distanze | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 56.340 | 6.860 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 60.010 | 8.180 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 63.410 | 8.940 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 62.240 | 10.030 |
| Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4' | 9.410 | 1.440 |
| Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 8.000 | 1.800 |
| Lunghezza della nervatura N5' | 26.140 | 4.490 |
| Lunghezza della nervatura N5 | 27.010 | 2.160 |
| Lunghezza della nervatura N4' | 47.430 | 4.340 |
| Lunghezza della nervatura N4 | 48.290 | 4.260 |
| Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4' | 53.640 | 5.690 |
| Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4 | 53.860 | 4.290 |
| Lunghezza della foglia | 164.670 | 9.720 |
| Larghezza della foglia | 150.590 | 10.190 |
| Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 205.030 | 19.900 |
| Lunghezza del picciolo | 95.060 | 15.710 |
| Lunghezza della nervatura N1 | 109.960 | 5.760 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2' | 147.390 | 8.590 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3' | 137.470 | 15.310 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4' | 33.700 | 11.190 |
| Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP' | -6.310 | 1.710 |
| Lunghezza della nervatura N2 | 97.610 | 9.420 |
| Lunghezza della nervatura N2' | 93.760 | 4.820 |
| Lunghezza della nervatura N3 | 72.940 | 10.190 |
| Lunghezza della nervatura N3' | 70.170 | 6.440 |
| Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 | 57.060 | 13.870 |
| Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' | 53.430 | 6.370 |

| angoli | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 66.040 | 3.340 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione | 64.640 | 5.530 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 53.670 | 5.600 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione | 53.490 | 4.160 |
| Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 66.410 | 7.580 |
| Angolo tra N3' e N4' | 68.490 | 7.480 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 51.370 | 5.200 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature | 49.460 | 5.970 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 54.000 | 4.730 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature | 57.410 | 3.840 |
| Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 56.790 | 7.970 |
| Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature | 54.960 | 5.610 |
| Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP' | 14.030 | 7.740 |
| Angolo tra D e D' con centro in N1 | 98.840 | 3.830 |
| Angolo tra S e S' con centro in N1 | 64.810 | 12.200 |
| Angolo tra I e I' con centro in N1 | 51.860 | 4.240 |
| Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 87.930 | 6.530 |
| Angolo tra N3' e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5' | 82.730 | 4.960 |

| rapporti | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4’ | 0.620 | 0.110 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4 | 0.640 | 0.100 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2’ | 0.580 | 0.200 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2 | 0.640 | 0.100 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a’ + b’ e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS’ e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI’ | 0.020 | 0.000 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 0.020 | 0.000 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.240 | 0.030 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.250 | 0.020 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.430 | 0.040 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.440 | 0.020 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.640 | 0.050 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.660 | 0.070 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.850 | 0.030 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.890 | 0.050 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI’ e la lunghezza della nervatura N3’ | 0.800 | 0.050 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3 | 0.820 | 0.020 |
| Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 1.090 | 0.030 |
| Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1 | 0.860 | 0.130 |
| Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2 | 0.640 | 0.120 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2’ | 0.680 | 0.080 |

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

## Bibliografia (12)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|---|---|---|---|---|
| Bica Daniela | 2007 | Vitigni di Sicilia | | Grillo |
| Giulietti C. | 1879 | Dizionario ampe-eno-logico ossia che tratta della vite e del vino e più specialmente delle località, scrittori e pubblicazioni relative | | Tip. sociale. Voghera |
| Landolina Nava S. | 1802 | Dell'antico vino Pollio siracusano. Lettera al signor cavaliere Andrea Zucchini e da questi comunicata al signor avvocato Lodovico Coltellini di Cortona. | | Bibl. Naz. di Napoli; Bibl. Comunale di Siracusa |
| Marescalchi A. | 1928 | Annuario Vinicolo | | Unione italiana Vini. Milano |
| Mendola, A. | 1868 | Estratto dal catalogo generale della collezione di viti italiane e straniere radunate in Favara | | Tip. Parrino e Carini, Favara (AG). Annali di Viticoltura e di Enol., vol. II, 1874. |
| Nicosia F. | 1735 | Podere fruttifero e dilettevole, diviso in tre parti - opera notevole di viticoltura | | in A. Felicella - Palermo |
| Notari | 1892 | I vitigni siciliani | | Annuario Gen. del Circolo Enofilo Italiano - Roma - Bertero. |
| Pastena B. | 1976 | Albanello | Rivista di Viticoltura e di Enologia | Anno XXIX, n. 11 |
| Pulliat V. | 1888 | Mille variétés de vignes | | Ed. Delahaye, Paris; Ed. Coulet, Montpellier |
| Robinson J., Harding J., Vouillamoz J. | 2012 | Wine Grapes. A complete guide to 1368 vine varieties, including their origins and flavours | | Allen Lane - Penguin Books |
| Trentin O. | 1895 | I vini d'Italia | | C.E. Elzeviriana - Buenos Aires. |
| Viala P., Vermorel V. | 1901 | Traité général de Viticulture | | Ampélographie. 7 Vol., Ed. Masson (Paris). 1901-1910. |