



Incrocio Manzoni 2-3

Carraro R., Migliaro D., Crespan M., 2015. Incrocio Manzoni 2-3. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 14/07/2015, ultimo aggiorn. 14/07/2015 url <http://vitisdb.it/varieties/show/1357>

Informazioni generali gestite da

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Informazioni botaniche

nome Incrocio Manzoni 2-3
tipo di origine incrocio intraspecifico
specie Vitis vinifera
gruppo di varietà non disponibile

genere Vitis
sottospecie sativa
vitigno da vino
breeder Luigi Manzoni
istituzione ibridatore non disponibile
anno di incrocio non disponibile
anno di selezione non disponibile

trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)
codice IVD-var_327

True-name

confermato **si**

Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti **no**

Sinonimi

nessun sinonimo disponibile per Incrocio Manzoni 2-3

Accessione principale

accessione principale Incrocio Manzoni 2-3
componente che l'ha inserita Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Accessioni standardizzate (1)

- Incrocio Manzoni 2-3 - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Tutte le accessioni (1)

- Incrocio Manzoni 2-3 - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

Profilo microsatellite standardizzato


| loci: | loci predefiniti (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 151 | 231 | 237 | 243 | 249 | 179 | 189 | 188 | 194 | 251 | 251 | 242 | 250 | 239 | 247 | 251 | 273 |

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini




germoglio



foglia



foglia pagina inferiore



grappolo


Riferimenti storici

L'Incrocio Manzoni 2-3 appartiene al gruppo Trebbiano x Traminer. I dati molecolari attualmente disponibili supportano il Trebbiano toscano ed il Traminer come genitori.

Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | immagini |
|-----|--|--------|----------------------|
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 5 | media |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 5 | media |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 1 / 2 | verde / verde e rosso |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 4 | ramato - rosso |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 5 | media |
| 065 | Foglia adulta: dimensione del lembo | 5 | medio |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 3 | pentagonale |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 / 2 | cinque / tre |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente |
| 072 | Foglia adulta: depressioni del lembo | 3 | deboli |
| 073 | Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie | 1 | assente |
| 074 | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale | 2 | a V |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 7 | elevata |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 | entrambi i lati rettilinei |
| 078 | Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza | 5 | medi |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 5 | chiuso |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 3 | a V |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata |
| 082 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori | 1 | aperti |
| 083-1 | Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori | 1 | a U |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori | 1 | assenti |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 3 | bassa |
| 085 | Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 3 | bassa |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa |
| 093 | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana | 3 | leggermente più corto |
| 094 | Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori | 5 | medio |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3) | 5 | media (1,1-1,3) |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 6 | medio-lungo |
| 203 | Grappolo: larghezza | 5 / 4 | medio / medio-stretto |
| 204 | Grappolo: compattezza | 5 | medio |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale | 3 | corto |
| 208 | Grappolo: forma | 2 | conico |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 2 | 1 - 2 ali |
| 220 | Acino: lunghezza | 4 | medio-corto |
| 221 | Acino: larghezza | 4 | medio-stretto |



| | | | |
|-----|--|---|----------------------|
| 223 | Acino: forma | 2 | sferoidale |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo |
| 227 | Acino: pruina | 5 | media |
| 229 | Acino: ombelico | 2 | apparente |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole |
| 235 | Acino: consistenza della polpa | 1 | molle |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo |

Ampelometria

OIV

| OIV | PDF | descrizione | valore | |
|-----|-----|--|--------|-------------------------|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | 4 | medio-corta |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | 5 | media (105 mm) |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | 5 | media (75 mm) |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | 6 | medio-lunga |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | 3 | corta (50 mm) |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | 4 | medio-corta |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 7 | grande (56°-70°) |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | 7 | grande (56°-70°) |
| 610 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 5 | medio (46°-55°) |
| 611 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5 | 1 | molto corta (15 mm) |
| 612 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | 2 | tra molto corto e corto |
| 613 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | 6 | medio-largo |
| 614 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | 2 | tra molto corto e corto |
| 615 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | 4 | medio-stretto |
| 616 | PDF | Foglia adulta: numero di denti tra il dente all'estremità di N2 e il dente all'estremità della prima nervatura secondaria di N2, inclusi i denti precitati | 7 | grande (circa 7-8) |
| 617 | PDF | Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2 | 7 | lunga (56-70 mm) |
| 618 | PDF | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare | 4 | tra aperto e chiuso |

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Incrocio Manzoni 2-3

Bibliografia (1)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|----------------------------|------|---------------------|---------|---------------------------------|
| Cancellier S., Roncador I. | 2000 | Gli incroci Manzoni | | La Tipografica (Treviso, Italy) |
