



Oseleta

Carraro R., Migliaro D., Crespan M., 2015. Oseleta. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 17/06/2015, ultimo aggiorn. 15/05/2020 url http://vitisdb.it/varieties/show/1371

Informazioni generali gestite da

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Informazioni botaniche

nome Oseleta
tipo di origine spontanea
specie Vitis vinifera
gruppo di varietà non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti
codice IVD-var_239

genere Vitis
sottospecie sativa
vitigno da vino

True-name

confermato **si**

Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti **si**

codice 358

nome ufficiale OSELETA N.

Sinonimi

nessun sinonimo disponibile per Oseleta

Accessione principale

accessione principale Oseleta

componente che l'ha inserita Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Accessioni standardizzate (1)

- Oseleta - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Tutte le accessioni (1)

- Oseleta - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 151 | 151 | 231 | 231 | 239 | 257 | 179 | 191 | 188 | 196 | 251 | 251 | 264 | 268 | 231 | 261 | 241 | 273 |

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini



germoglio



foglia pagina superiore




grappolo

Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|-----|--|--------|----------------------|----------|
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto | |
| 002 | Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 2 | al margine | |
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 5 | media | |

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 7 | elevata |
| 005 | Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 2 | verde e rosso |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 / 2 | verde / verde e rosso |
| 009 | Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi | 2 | verde e rosso |
| 010 | Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi | 1 | verde |
| 011 | Germoglio: densità dei peli eretti sui nodi | 1 | nulla o molto bassa |
| 012 | Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi | 1 | nulla o molto bassa |
| 013 | Germoglio: densità dei peli striscianti sui nodi | 1 | nulla o molto bassa |
| 014 | Germoglio: densità dei peli striscianti sugli internodi | 1 | nulla o molto bassa |
| 015-1 | Germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle perule delle gemme | 1 | assente |
| 015-2 | Germoglio: intensità della pigmentazione antocianica delle perule delle gemme | 1 | nulla o molto bassa |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 3 | bronzato |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 4 | medio-bassa |
| 054 | Foglia giovane: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 1 | nulla o molto bassa |
| 055 | Foglia giovane: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 3 | bassa |
| 065 | Foglia adulta: dimensione del lembo | 4 | medio-piccolo |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 3 | pentagonale |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 / 4 | cinque / sette |
| 069 | Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo | 3 | verde chiaro |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente |
| 071 | Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | assente |
| 072 | Foglia adulta: depressioni del lembo | 1 | assenti o molto deboli |
| 073 | Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie | 1 | assente |
| 074 | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale | 2 | a V |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 3 | bassa |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 / 3 | entrambi i lati rettilinei / entrambi i lati convessi |
| 077 | Foglia adulta: dimensione dei denti in rapporto alla dimensione del lembo | 5 | medi |
| 078 | Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza | 7 | lunghi |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 1 / 2 | a U / a parentesi graffa ({}) |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata |
| 082 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori | 2 | chiusi |
| 083-1 | Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori | 2 | a parentesi graffa ({}) |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori | 9 | presenti |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa |
| 085 | Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa |
| 086 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa |
| 088 | Foglia adulta: peli striscianti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | 1 | assenti |
| 089 | Foglia adulta: peli eretti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | 1 | assenti |
| 090 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sul picciolo | 1 | nulla o molto bassa |
| 091 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sul picciolo | 1 | nulla o molto bassa |
| 093 | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana | 5 | uguale |
| 094 | Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori | 6 | medio-profondo |



| | | | | |
|-----|--|-------|---|---|
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3) | 4 | medio-bassa (0,9-1,1) | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 3 | corto |  |
| 203 | Grappolo: larghezza | 3 | stretto | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 7 | compatto | |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale | 5 | medio | |
| 208 | Grappolo: forma | 1 | cilindrico | |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 1 / 2 | assenti / 1 - 2 ali | |
| 220 | Acino: lunghezza | 3 | corto | |
| 221 | Acino: larghezza | 3 | stretto | |
| 223 | Acino: forma | 3 | ellissoidale largo | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 6 | blu nero | |
| 226 | Acino: uniformità del colore della buccia | 2 | uniforme | |
| 227 | Acino: pruina | 7 | elevata | |
| 228 | Acino: spessore della buccia | 7 | spessa | |
| 229 | Acino: ombelico | 2 | apparente | |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole | |
| 232 | Acino: succulenza della polpa | 2 | mediamente succosa | |
| 235 | Acino: consistenza della polpa | 1 | molle | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |

Ampelometria

OIV

| OIV | PDF | descrizione | valore | |
|-----|-----|--|--------|------------------------------------|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | 7 | lunga (165 mm) |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | 8 | tra lunga e molto lunga |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | 7 | lunga (95 mm) |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | 9 | molto lunga (55 mm e oltre) |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | 4 | medio-corta |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | 5 | media (60 mm) |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 3 | piccolo (30°-45°) |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 610 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 7 | grande (56°-70°) |
| 611 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5 | 3 | corta (25 mm) |
| 612 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | 5 | medio (14 mm) |
| 613 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | 7 | largo (18 mm) |
| 614 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | 4 | medio-corto |
| 615 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | 6 | medio-largo |
| 616 | PDF | Foglia adulta: numero di denti tra il dente all'estremità di N2 e il dente all'estremità della prima nervatura secondaria di N2, inclusi i denti precitati | 7 | grande (circa 7-8) |
| 617 | PDF | Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2 | 7 | lunga (56-70 mm) |
| 618 | PDF | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare | 1 | molto aperto (fino a circa -35 mm) |

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Oseleta

Bibliografia (2)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|---|------|--|---------|--|
| Cancellier S., Giacobbi P. | 2004 | Antichi vitigni veneti a bacca nera | | In: Recupero, conservazione e valorizzazione del germoplasma viticolo veneto |
| Vantini F., Tacconi G., Gastaldelli M., Govoni C., Tosi E., Malacrinò P., Bassi R., Cattivelli L. | 2003 | Biodiversity of grapevines (<i>Vitis vinifera</i> L.) grown in the province of Verona | Vitis | 42 (1): 35-38 |