



# Barbera ciarà

Schneider A., Ruffa P., Raimondi S., 2019. Barbera ciarà. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 19/02/2020, ultimo aggiorn. 02/04/2020 url <http://vitisdb.it/varieties/show/1651>

## Informazioni generali gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

## Ringraziamenti

Regione Piemonte

## Informazioni botaniche

**nome** Barbera ciarà  
**tipo di origine** spontanea  
**specie** non disponibile  
**gruppo di varietà** Neutre  
**trueness to type** informazione non inserita  
**codice** IVD-var\_481

**genere** non disponibile  
**sottospecie** non disponibile  
**vitigno da**

## True-name

confermato **si**

## Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti **no**

## Sinonimi

**sinonimi accertati (1)**  
 sinonimi accertati dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico  
 Ciarà(Roero (Piemonte))

## Accessione principale

**accessione principale** Barbera ciarà  
**componente che l'ha inserita** Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

## Accessioni standardizzate (1)

- Barbera ciarà - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

## Tutte le accessioni (1)

- Barbera ciarà - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

## Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

## Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti ( 9 )																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	135	155	225	227	247	247	185	189	196	200	251	259	242	256	239	267	241	273

## Immagini



germoglio



foglia



grappolo

## Riferimenti storici

Il primo e unico riferimento storico per questo vitigno è relativamente recente (Sannino, 1926). Trattandosi di una breve monografia comparsa sulla Rivista di Ampelografia, la descrizione che se ne riporta e i luoghi di coltura (Sommariva Perno nel Roero) sono ben coerenti con il vitigno qui presentato. La Barbera Ciarà ha ben pochi caratteri in comune con il Barbera, mentre il suffisso Ciarà viene dal nome di una famiglia di viticoltori che hanno diffuso la varietà localmente.




**Diffusione & variabilità**

Recuperata a Sommariva Perno, nel Roero, non pare che la coltura della Barbera Ciaria si sia espansa nemmeno nel passato, considerando che non viene citata negli accurati elenchi dei vitigni della provincia di Cuneo riportati nei Bollettini ampelografici di fine '800. Oggi non è più coltivata, se non da qualche amatore.

**Utilizzazione tecnologica**

Un tempo molta della produzione era smerciata come uva da tavola, vista la vocazione del Roero per i frutti da mensa. In particolare dall'area di coltura della Barbera ciaria provenivano uve nere da consumo fresco. Veniva anche vinificata, generalmente in blend con altre uve da vino locali. La coltura di questo vitigno è oggi pressoché scomparsa, né alcuno ha provato a farne del vino varietale.

**Ampelografia**

OIV	descrizione	valore		immagini
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	8	tra elevata e molto elevata	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	1	verde	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	2	giallo	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	7	elevata	
067	Foglia adulta: forma del lembo	2 / 4	cuneiforme / orbicolare	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	1	uno (foglia intera)	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	5	media	
076	Foglia adulta: forma dei denti	2	entrambi i lati rettilinei	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	1 / 2	a U / a parentesi graffa (f)	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	4	medio-bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	4	medio-bassa	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	6	medio-lungo	
204	Grappolo: compattezza	6	medio-compacto	
208	Grappolo: forma	2	conico	
220	Acino: lunghezza	4 / 5	medio-corto / medio	
221	Acino: larghezza	4 / 5	medio-stretto / medio	
223	Acino: forma	2	sferoidale	
225	Acino: colore della buccia	6	blu nero	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

**Ampelometria**

---

*OIV*

nessun descrittore presente per Barbera ciaria

*Superampelo*

---

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Barbera ciaria

**Bibliografia (1)**

---

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Sannino A.	1926	Note ampelografiche. Barbera "Ciaria".		Rivista di ampelografia, anno VII, n. 12, 179-180.

---